Silmarin nöroblastom hücrelerinde pro-inflamatuvar sitokin üretimini düzenleyerek sisplatin ile birlikte hücre ölümünü etkiler mi?

Does silymarin combined with cisplatin affect neuroblastoma cell death via pro-inflammatory cytokine production?

Zekiye ALTUN¹, Emre ÇECEN², Ayça PAMUKOĞLU¹, Safiye AKTAŞ¹, Nur OLGUN³

¹Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, İzmir

²Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Onkolojisi Anabilim Dalı, Aydın

³Dokuz Eylül Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Klinik Onkoloji Anabilim Dalı, Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı, İzmir

ÖZ

Amaç: Nöroblastom çocukluk çağında en sık görülen ekstrakraniyal solid tümördür. Sisplatin çocukluk çağı kanserlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Silmarin “milk thistle”dan ekstrakte edilen bir poliflavonoid bileşiktir. Pro-inflamatuvar sitokinlerin nöroblastomda tümör gelişimi ve metastazında rolleri vardır. Bu çalışmanın amacı, nöroblastom hücrelerinde silmarinin tek başına ve sisplatin ile birlikte kullanılmaları durumunda anti-tümoral ve pro-inflamatuvar sitokin üretimi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesidir.

Yöntemler: C1300 fare nöroblastom hücreleri 37°C %5 CO₂ ve DMEM hücre çoğaltma ortamı kullanılarak çoğaltıldı. Hücrelere silmarin, sisplatin ve silmarin-sisplatin kombinasyonu uygulandı ve hücre canlılığı üzerindeki etkisi WST-1 ve apoptotik hücre ölümü akış sitometrik olarak annexin-V/PI testi ile değerlendirildi. Pro-inflamatuvar sitokinler olan IL-6, IL-1β ve TNF-α düzeyleri fare ELISA testleri kullanılarak ölçüldü. Gruplar arasındaki farklar SPSS 15.0 programında Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney-U analizi ile değerlendirildi ve p<0.05 istatistiksel anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Silmarin doz bağımlı olarak hücre canlılığını kontrol grubuna göre azalttı. Silmarin-sisplatin kombinasyonu hücre canlılığını sisplatinine göre daha da azalttı. Sisplatin pro-inflamatuvar sitokin düzeylerini artırdı. Pro-inflamatuvar sitokin düzeyleri tek başına silmarin ile değişmedi. Silmarin-sisplatin kombinasyonu pro-inflamatuvar sitokin düzeylerini sisplatinine göre azalttı.

Sonuç: Bulgularımız silmarinin tek başına ve sisplatin ile kombine edildiğinde potansiyel anti-tümoral bir ajan olduğunu göstermektedir. Silmarin-sisplatin kombinasyonunun anti-tümoral etkisi pro-inflamatuvar sitokin düzeylerinin azaltılması ile gerçekleşiyor olabilir. Silmarinin anti-tümoral etkisinin ve etki mekanizmalarının in-vivo hayvan modelleri üzerinde denenerek kanıtlanması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Silmarin, nöroblastom, anti-proliferatif, sisplatin, pro-inflamatuvar sitokin

ABSTRACT

Objective: Neuroblastoma is the most common extracranial solid tumor in childhood. Cisplatin is widely used in pediatric malignancies. Silymarin is a polyflavonoid compound extracted from “milk thistle”. Pro-inflammatory cytokines have a role in tumor growth and metastases of neuroblastoma cells. The aim of this study was to evaluate effects of silymarin alone or in combination with cisplatin on the production of antitumoral and pro-inflammatory cytokine in neuroblastoma cells.

Methods: C1300 mouse neuroblastoma cells were grown with DMEM medium in 37°C and 5% CO₂ conditions. The cells were treated with silymarin, cisplatin and silymarin-cisplatin combinations and cell viability was evaluated using WST-1 and apoptotic cell death with flow cytometric annexin-V/PI tests. Levels of pro-inflammatory cytokines of IL-6, IL-1β and TNF-α were measured with mouse ELISA kits. Differences between the groups were evaluated with Kruskal-Wallis and Mann-Whitney-U analysis in SPSS 15.0 program and p<0.05 was accepted as a level of statistically significant.

Results: Silymarin reduced the cell viability in a dose-dependent manner when compared with control. Silymarin-cisplatin combination greatly reduced viability of cells compared with cisplatin alone. Cisplatin increased the level of pro-inflammatory cytokines. Pro-inflammatory cytokine levels did not change with silymarin alone. Combinations of silymarin and cisplatin decreased pro-inflammatory cytokine levels except IL-1β when compared with cisplatin alone.

Conclusion: Our results indicated that Silymarin is a potential anti-tumoral agent alone and in combination with cisplatin. Anti-tumoral effects of this combination possibly realized by decreasing pro-inflammatory cytokine levels. Anti-tumoral effect and mechanisms of silymarin should be proven by testing them on the in-vivo animal models.

Key words: Silymarin, neuroblastoma, anti-proliferative, cisplatin, pro-inflammatory cytokines

Alındığı tarih: 08.12.2015

Kabul tarihi: 16.12.2015

Ulusal Kanser Kongresi, Susesi Otel, Antalya, 19-23.04.2013'te sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Yazışma adresi: Doç. Dr. Zekiye Altun, Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı, İnciraltı-35340-İzmir
e-mail: zekiyesaltun@gmail.com

GİRİŞ

Silmarin “milk thistle” olarak bilinen bitkinin aktif ekstratıdır ⁽¹⁾. Silmarin “milk thistle” [*Silybum marianum* (L.) Gaertn. (Asteraceae)] tohumlarından izole edilmektedir. Silmarinin içeriğini genelde %65-80 oranında silybin A, silybin B, isosilybin A, isosilybin B, silychristin, ve silydianin bulunan flavonolignan karışımı ve %20-35 oranında yağ asitleri ve polifenik bileşikler oluşturmaktadır ^(2,3). Özellikle farklı etiyolojik mekanizmalara bağlı olarak gelişen karaciğer rahatsızlıklarında hem insan çalışmalarında hem de hayvan modellerinde koruyucu olduğu gösterilmiş bitkisel bir üründür ^(1,4). Oksidatif stres ve enflamasyonun kanser tedavisi alan kişilerde ortaya çıkan toksik reaksiyonların bir kısmından sorumlu olduğu da bilinmektedir. Silmarinin reaktif oksijen ürünleri ve sekonder sitokinlerle meydana gelen oksidatif stres ve sürekli enflamatuvar uyarıdan karaciğeri koruduğu bildirilmektedir ⁽⁵⁾.

Nöroblastom çocukluk çağında en sık gözlenen solid tümördür ⁽⁶⁾. En iyi tedavilerle bile sağkalım oranları %40’ları geçmemektedir. Ayrıca tedavisinde kullanılan ana kemoterapötik ajan olan sisplatinin oluşturduğu nefrotoksisite, ototoksisite ve nörotoksisite gibi olumsuz yan etkiler nedeniyle yeni tedavi ajanlarının saptanmasına yönelik gereksinim hâlen devam etmektedir. Pro-inflamatuvar sitokinlerin nöroblastomda tümör gelişimi ve metastazı ile ilişkili oldukları bilinmektedir.

Silmarinin mesane, kolon, dil, prostat, serviks, hepatik, deri, lösemi, meme, over ve akciğer kanserlerinde antikanser potansiyeli olduğu *in vitro* ve *in vivo* çalışmalarda belirtilmektedir ⁽⁷⁻⁹⁾. Kanser hastalarının silmarini gönüllü olarak kullanımı ile antikanser etkileri saptanmıştır ⁽¹⁰⁾. Silmarinin çoğu ülkede kemoterapi alan hastalar tarafından kemoterapiye bağlı hepatotoksisiteyi önlemek ya da hafifletmek için tamamlayıcı ve alternatif tıp açısından kullanıldığı rapor edilmektedir ⁽¹⁰⁻¹²⁾. Güvenilir bir bileşik olması yanında ayrıca kanser tedavisini interfere etme potansiyelinin düşük olduğu bildirilmektedir ⁽¹⁰⁻¹²⁾. Silmarin bitkisinin kendisinin ya da içerdiği

bileşiklerin asetominofen, sisplatin, vinkristin ve siklosporin ve aynı zamanda radyoterapiye bağlı nefrotoksisiteyi önleyebileceği de bildirilmiştir ⁽¹³⁻¹⁶⁾.

Silmarinin anti-inflamatuvar özellikleri deneysel *in-vivo* çalışmalarda gösterilmiştir ^(7,17). Bu çalışmalarda öncelikle anti-kanser bir ajan olarak deri kanseri, prostat kanseri, küçük hücreli dışı akciğer kanseri ve kolon kanser hayvan modellerinde tümör hacmini ve ağırlığını azalttığı, hücre proliferasyonunu, lipid peroksidasyonunu ve DNA sentezini azaltıcı etki gösterdiği belirtilmektedir. Silmarinin anti-inflamatuvar etkisini inflamasyon, hücre survivalı, diferansiasyon ve hücre çoğalması gibi hücresel olaylarla ilişkili olan transkripsiyon faktörü olan nükleer faktör kappa B (NF-kB)’i inhibe ederek yaptığı belirtilmektedir ^(18,19).

Silmarin hem anti-kanser potansiyeli hem de kemoterapötiklerin istenmeyen toksik etkilerini düzenleyebilmesi yönüyle kanser tedavisinde farklı yönleriyle önemli bir bitkisel bileşik olarak görünmektedir.

Bu çalışmanın amacı nöroblastom hücrelerinde silmarinin tek başına ve sisplatin ile birlikte kullanılmaları durumunda anti-proliferatif ve pro-inflamatuvar sitokinler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesidir.

GEREÇ ve YÖNTEM

C1300 fare nöroblastom hücreleri (DSMZ) 37°C %5 CO₂ koşullarında çoğaltıldı. Hücreler DMEM (Biochrom) hücre kültür ortamına %10 fetal bovin serum (FBS) (Biochrom), %1 penilin/streptomisin ve %1 L-glutamin eklenerek çoğaltıldı. Silmarin (Sigma) stok çözelti olarak hazırlanarak kullanıldı. Stok çözeltiden silmarin ve sisplatin (Hexal) hücre kültür ortamı ile dilüe edilerek değişik konsantrasyonlarda taze olarak denendi. Tüm deneyler en az 3’er yinelenmeli olarak gerçekleştirildi.

Hücre canlılığı

Silmarinin tek başına ve sisplatin ile birlikte fare C1300 nöroblastom hücrelerinin canlılığı üzerindeki etkisi WST-1 (Roche) hücre canlılık testi ile değer-

lendirildi. Bunun için hücreler 10^4 hücre/kuyucuk olacak şekilde 96 kuyucuklu hücre kültür plaklarına ekildi. Yirmi dört saatlik inkübasyon sonrası çoğalan hücrelerin ortamları ajan içeren ortamlarla (Siplatin ve silmarinin değişik dozları) değiştirilerek, hücreler ajanlarla birlikte her bir ajan için altışar yinelemeli olacak şekilde 24 saatlik inkübasyona bırakıldı. Yirmi dört saatlik ajanlarla uygulamanın bitiminde hücrelere WST-1 reaktifi ek 4 saat 37°C 'de inkübe edildi ve inkübasyon sonunda ELISA plak okuyucuda (Thermo) absorbanslar 450/630 nm'de okundu. Kontrol grubunun hücre canlılıkları %100 kabul edilerek, diğer gruplardaki hücre canlılık oranları hesaplandı. Hücreler üzerinde gerçekleştirilen tüm deneyler ve analizler 24 saatlik inkübasyon süresi sonrasında elde edilen örnekler üzerinde gerçekleştirildi. Hücre canlılık analizlerinde yaklaşık %50 hücre canlılığını azaltan dozlar deneylerde kullanılmak üzere seçildi.

Apoptotik hücre ölümünün belirlenmesi

Silmarin, sisplatin ve silmarin-sisplatin kombinasyonlarının apoptotik hücre ölümüne yol açıp açmadığı Annexin-V/Propidyum İyodid (Annexin-V/PI) floresan boya yöntemi kullanılarak akış sitometri cihazı (Accuri C6, BD Biosciences, USA) ile değerlendirildi. Bunun için kısaca hücreler ajanlarla inkübasyon süreleri sonrasında uygun şekilde toplandı. Hücrelerin üzerine Annexin-V binding tamponu eklendi. Kontrol tüpüne ve diğer örnek içeren tüplerin her birine Annexin-V binding tamponu, Annexin-V, fikoeritrin (PE) eklenerek tüpler 15 dk. $+4^{\circ}\text{C}$ 'de bekletildi. Inkübasyon sonunda her bir tüpe Annexin-V binding tamponu eklendi. Hücreler akım sitometeri cihazında 488/667 nm eksitasyon ve emisyon dalga boylarında floresan ışımaları ölçüldü. Daha sonra cihazın kendi analiz programında BD Accuri C6 Software (BD Biosciences, USA) analiz edildi. Sadece Annexin-V negatif /PI negatif hücreler canlı olarak kabul edildi. Annexin-V pozitif/PI negatif hücreler erken apoptotik, Annexin-V pozitif/PI pozitif hücreler geç apoptotik ya da nekrotik hücreler olarak değerlendirildi. Her bir deney üç kez yinelenildi.

Sitokin ölçümleri

Pro-inflamatuvar sitokinler olan interlökin 6 (IL-6), interlökin 1β (IL- 1β) ve tümör nekrozis faktör- α (TNF- α) düzeyleri fare ELISA kitleri (eBiosciences) kullanılarak hücre kültür süpernatantlarında ölçüldü. Kit içeriğine uygun olarak hücre kültür örneklerinde IL-6, IL- 1β ve TNF- α düzeyleri çalışıldı. Standart grafiklere göre elde edilen absorbans değerlerinden konsantrasyonlar pg/mL olarak hesaplandı.

İstatistiksel analiz

Verilerin istatistiksel analizi için SPSS 15 paket programı kullanıldı. Değişkenler normal dağılım göstermediğinden, veri ortalamalarının karşılaştırılmasında non-parametrik yöntemler olan grupları karşılaştırmada Kruskal-Wallis varyans analizi sonrasında Mann-Whitney-U testi kullanıldı. $p<0.05$ istatistiksel anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

Silmarinin doz bağımlı olarak (1, 5 ve 10 μM dozlarında) nöroblastom hücre canlılığını istatistiksel olarak kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde azalttığı saptandı ($p<0.05$) (Şekil 1). Sisplatin 15 μM dozunda hücre canlılığını kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde azalttı ($p<0.05$) (Şekil 2). Silmarin-sisplatin kombinasyonları hücre canlılığını sisplatin grubuna göre daha da azalttı ($p<0.05$) (Şekil 2). Sisplatin, silmarin ve ikili kombinasyonları ile nöroblastom hücrelerinde apoptotik hücre ölümü kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde indüklendi ($p<0.05$) (Şekil 3). Silmarin-sisplatin kombinasyonları (5 ve 10 μM Silmarin) apoptotik hücre ölümünü sisplatin grubuna göre daha da arttırdı ($p<0.05$) (Şekil 3).

Nöroblastom hücrelerine sisplatin uygulaması pro-inflamatuvar IL-6, IL- 1β ve TNF- α sitokin düzeylerini kontrol grubuna göre arttırdı ($p<0.05$) (Şekil 4,6). Silmarin-sisplatin kombinasyonu pro-inflamatuvar sitokin düzeylerini IL-1 IL- 1β hariç sisplatin grubuna göre istatistiksel anlamlı düzeyde azalttı (Şekil 4,5,6).

Şekil 1. Silmarin (Silym) C1300 nöroblastom hücrelerinde doz bağımlı olarak (1, 5 ve 10 µm dozlarında) kontrol grubuna göre hücre canlılığını azalttı (n=6)(* p<0,05).

Şekil 2. Silmarin(Silym) –sisplatin (Sispl) kombinasyonları C1300 nöroblastom hücrelerinde hücre canlılığını sisplatine göre daha da azalttı (n=6) (*p<0,05).

Şekil 3. Silmarin (Silym)-sisplatin (Sispl) kombinasyonları C1300 nöroblastom hücrelerinde apoptozu sisplatine göre daha da arttırdı (n=6) (*p<0,05).

Şekil 4. Nöroblastom hücrelerine sisplatin (Sispl) uygulaması pro-inflamatuvar IL-6 sitokin düzeylerini kontrol grubuna göre arttırdı (*p<0,05). Tek başına silmarin (Silym) uygulamaları ile (1, 5 ve 10 uM dozlarında) IL-6 düzeyleri kontrol grubuna göre değişmedi. Sisplatin 15uM-Silmarin 1uM kombinasyonu sisplatin uygulamasına göre IL-6 düzeyini azalttı (ϕ p<0,05).

Şekil.5. Nöroblastom hücrelerine sisplatin (Sispl) uygulaması pro-inflamatuvar TNF- α sitokin düzeylerini kontrol grubuna göre arttırdı (* $p<0,05$). Tek başına 10 uM silmarin (Silym) uygulaması TNF- α düzeyleri kontrol grubuna göre arttırırken ($p<0,05$), 1 ve 5 uM dozlarda değişmedi. Sisplatin ile silmarin kombinasyonları (1, 5 ve 10 uM), sisplatin uygulamasına göre TNF- α düzeyini azalttı ($\phi p<0,05$).

Nöroblastom hücrelerine sisplatin uygulaması pro-inflamatuvar IL-6 sitokin düzeylerini kontrol grubuna göre arttırdı ($p<0.05$) (Şekil 4). Buna karşın IL-6 düzeyleri tek başına silmarin ile değişmedi (Şekil 4). Silmarin 1uM-sisplatin 15uM kombinasyonu pro-inflamatuvar IL-6 sitokin düzeylerini sisplatin grubuna göre istatistiksel anlamlı düzeyde azaltırken ($p<0.05$), 5 ve 10 uM silmarin kombinasyon dozlarında değiştirmede ($p<0.05$) (Şekil 4).

Nöroblastom hücrelerine sisplatin uygulaması pro-inflamatuvar TNF- α sitokin düzeylerini kontrol grubuna göre arttırdı ($p<0.05$) (Şekil 5). Tek başına 10 uM silmarin uygulaması TNF- α düzeyleri kontrol grubuna göre arttırırken ($p<0.05$), 1 ve 5 uM dozlarda değişmedi. Sisplatin ile silmarin kombinasyonları (1, 5 ve 10 uM), sisplatin uygulamasına göre TNF- α düzeyini azalttı ($p<0.05$) (Şekil 5).

Nöroblastom hücrelerine sisplatin uygulaması

pro-inflamatuvar IL-1 β sitokin düzeylerini kontrol grubuna göre arttırdı ($p<0.05$) (Şekil 6). Tek başına 5 ve 10 uM silmarin uygulaması IL-1 β düzeyleri kontrol grubuna göre arttırırken ($p<0.05$), 1 uM dozunda değişmedi ($p>0.05$). Sisplatin ile silmarin kombinasyonları tek başına sisplatin uygulamasına göre IL-1 β düzeylerini değiştirmede ($p>0.05$) (Şekil 6).

TARTIŞMA

Silmarin değişik organ toksisitelerine karşı koruyucu olarak kullanılan bir bitkisel üründür ⁽²⁰⁾. Özellikle başta hepatotoksiste olmak üzere nefrotoksiste, kanser, nörotoksiste, akciğer ve prostat hastalıklarına karşı koruyucu etkileri bildirilmiştir ^(8,20-24). Silmarinin koruyucu etki mekanizmasının antioksidan ve radikal yakalayıcı etkisiyle meydana geldiği belirtilmektedir. Yine hücre taşıyıcılarını ve reseptör-

Şekil 6. Nöroblastom hücrelerine sisplatin (Sispl) uygulaması pro-inflamatuvar IL-1 β sitokin düzeylerini kontrol grubuna göre arttırdı (* $p<0,05$). Tek başına 5 ve 10 μ M silmarin (Silym) uygulaması IL-1 β düzeyleri kontrol grubuna göre arttırırken ($p<0,05$), 1 μ M dozunda değişmedi. Sisplatin ile silmarin kombinasyonları tek başına sisplatin uygulamasına göre IL-1 β düzeylerini değiştirmede ($p>0,05$).

lerini de modüle ederek bu etkinin gerçekleştiği belirtilmektedir. Ayrıca silmarinin özellikle TNF- α 'ı azaltarak anti-enflamatuvar etkisinin eritrosit lizisini ve sisplatinin indüklediği akut nefrotoksisteye karşı koruduğu belirtilmektedir⁽²⁰⁾.

Bugüne dek nöroblastoma ve silmarin ilişkili sınırlı sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir⁽²⁵⁻²⁷⁾. Silmarinin NB-1 ve IMR-32 insan nöroblastom hücrelerinde genelde nöronal ve nöroblastom hücrelerinde baskılanmış bulunan ve viral klirensde etkili olan Major Hitokompatibilite Kompleks Sınıf I'i (MHC) aktive ettiği gösterilmiştir⁽²⁵⁾. Yine başka bir çalışmada, fare Neuro-2a hücrelerinde parkinson ve alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların etiyolojisinde yer alabilen mangana bağlı nörotoksisteye karşı koruyucu olduğu saptanmıştır⁽²⁶⁾. Silmarinin mangana karşı koruyucu etkisinin radikal aracılı hücre ölümünü düzenleyerek gerçekleştiği belirlenmiştir. Silmarinin major aktif bileşeni olan silibinin metastatik özellikli insan SK-N-MC and SK-N-BE(2) nörob-

lastoma hücrelerinde anti-kanser özelliği test edilmiş ve özellikle SK-N-MC hücre hattında Akt aracılı NF- κ B1 üzerinden supresyon yaptığı gösterilmiştir⁽²⁷⁾. Bugüne dek yapılan çalışmalarda silmarinin tek başına ya da sisplatin kombinasyonu ile pro-inflamatuvar proteinler üzerindeki etkisi incelenmemiştir.

Bu çalışmada, fare kökenli C1300 nöroblastom hücrelerinde doz bağımlı olarak hücre canlılığını azaltarak apoptotik hücre ölümüne neden olduğu daha önce yapılan bir çalışma ile uyumlu olarak belirlenmiştir⁽²⁷⁾. Yine silmarinin nöroblastom tedavisinde kullanılan ana tedavi ajanı olan sisplatin ile benzer düzeyde hücre canlılığını azalttığı gibi aynı zamanda hücreleri apoptotik hücre ölümüne sürüklemiştir. Silmarinin sisplatin ile kombine edilmesi doz bağımlı olarak hücre canlılığını daha önce meme hücrelerinde gerçekleştirdiği çalışma ile benzer olarak azaltmıştır⁽²⁸⁾. Bu etkinin de yine apoptotik hücre ölümü üzerinden gerçekleştiği saptanmıştır. Silmarin

daha önce gerçekleştirilen *in vivo* çalışmalarla uyumlu olarak özellikle sisplatin ile indüklenen IL-6 ve TNF- α gibi pro-inflamatuvar sitokin düzeylerini azaltmıştır ^(20,29). Silmarinin kendisi yalnızca 10 uM dozunda TNF- α düzeyini artırırken diğer sitokin düzeylerinde bir değişiklik yapmamıştır. Silmarinin çeşitli kimyasallara bağlı gelişen toksik etkilere karşı koruyucu olduğu belirtilmektedir ^(5,29,30). Silmarin nöroblastom hücrelerinde hem tek başına hem de sisplatin kombinasyonu ile ortaya çıkan pro-inflamatuvar yanıtı azaltmıştır.

Silmarinin başlıca karaciğer olmak üzere sıklıkla kanser hastalarının tedavisi sırasında ilaçlarla ortaya çıkan toksik reaksiyonlardan koruduğu *in vivo* ve *in vitro* çalışmalarda gösterilmiştir ⁽⁵⁾. Silmarinin hücre sel hasara neden olan reaktif oksijen ürünleri ve sekonder sitokinlerle meydana gelen oksidatif stres ve devamlı enflamasyondan koruduğu belirtilmektedir. Ratlarda gerçekleştirilen bir çalışmada, sisplatine bağlı gelişen hepatoselüler hasara karşı antioksidan enzimleri artırarak ve lipid peroksidasyonunu azaltarak karaciğer fonksiyon testlerini düzeltmiştir ⁽³⁰⁾. Yine karaciğer hücrelerinde metotraksat, etanol ve asetaminofen gibi ajanlarla ortaya çıkan hepatotoksositeye karşı antioksidan glutatyon düzeylerini arttırarak ve IL-6, TNF- α 'ı azaltarak etki gösterdiği belirlenmiştir ⁽²⁹⁾. Bir diğer *in vivo* çalışmada T hücreli bağımlı hepatite karşı silmarinin AST ve ALT düzeylerini ve yine hepatik TNF düzeylerini azaltarak koruyucu etki gösterdiği belirlenmiştir ⁽³¹⁾.

Silmarinin kronik böbrek yetmezliği olan ve periton diyalizi gerçekleştirilen hastalarda alınması ile özellikle TNF- α 'nın pro-enflamatuvar etkilerini baskılayarak bu hastalarda ortaya çıkan enflamatuvar anemiye düzeltici etkisi belirlenmiştir ⁽³²⁾.

Silmarinin radikal yakalayıcı ve antioksidan özellikleri kanser hastalarında normal hücrelerin onkolojik tedaviye toleransla birlikte anti-kanser etkiyi bozmadan kanser tedavisine toleransı da arttırabileceği belirtilmektedir ^(33,34). Bu yönüyle de silmarin hem kemoterapiye bağlı gelişen yan etkileri azaltarak doz azaltmaya gerek kalmadan etkin dozda kemoterapi uygulamasına izin vererek kemoterapi toleransı-

nı arttırabilir hem de anti-kanser etkinliği ile kanser tedavisine katkı sağlayabilir ⁽³⁶⁾. Silmarinin sisplatin ile ortaya çıkan hepatotoksosite, nefrotoksosite ve ototoksositeye karşı koruyucu etkili olduğu bildirilmektedir ^(30,32,36). Bu çalışmada, silmarinin nöroblastom hücrelerinde apoptoz ile birlikte pro-inflamatuvar sitokinleri azaltması silmarinin potansiyel antikanser etkisine işaret etmektedir. Diğer yandan da sisplatin ile kombine kullanılması sisplatinin oluşturduğu yan etkilerden biri olan nörotoksositeyi azaltarak sisplatin ile anti-kanser tedavide kanser hücreleri üzerinde istenen apoptotik hücre ölümüne sürükleyici etkiyi bozmadığı düşünülmüştür.

SONUÇ

Bu çalışma silmarinin tek başına ve sisplatin ile kombine edildiğinde de potansiyel anti-tumoral bir ajan olabileceğini göstermektedir. Silmarinin kendisi ve silmarin-sisplatin kombinasyonunun pro-inflamatuvar sitokin düzeylerini azaltması anti-tumoral etkisinin ortaya çıkmasında etkili olabilir. Silmarinin anti-tumoral etki mekanizmalarının daha ileri moleküler çalışmalarla hücre kültürü ve in-vivo hayvan modelleri üzerinde denenerek kanıtlanması gerekmektedir.

KAYNAKLAR

1. Rainone F. Milk thistle. *Am Fam Physician* 2005;72:1285-1288.
2. Wagner H, Diesel P, Seitz M. The chemistry and analysis of silymarin from *Silybum marianum* Gaertn. *Arzneimittelforsch* 1974;24:466-471.
3. Davis-Searles PR, Nakanishi Y, Kim NC, Graf TN, Oberlies NH, Wani MC, et al. Milk thistle and prostate cancer: differential effects of pure flavonolignans from *Silybum marianum* on antiproliferative end points in human prostate carcinoma cells. *Cancer Res* 2005;65:4448-4457. <http://dx.doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-04-4662>
4. Rambaldi A, Jacobs BP, Iaquinio G, Gluud C. Milk thistle for alcoholic and/or hepatitis B or C liver diseases--a systematic cochrane hepato-biliary group review with meta-analyses of randomized clinical trials. *Am J Gastroenterol* 2005;100(11):2583-91. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1572-0241.2005.00262.x>
5. Comelli MC, Mengs U, Schneider C, Prosdoci M. Toward the definition of the mechanism of action of silymarin: activities related to cellular protection from toxic damage induced by chemotherapy. *Integr Cancer Ther* 2007;6(2):120-9. <http://dx.doi.org/10.1177/1534735407302349>
6. Altun Z, Güneş D, Aktaş S, Erbayraktar Z, Olgun N. Protective Effects of Acetyl-L-Carnitine on Cisplatin

- Cytotoxicity and Oxidative Stress in Neuroblastoma. *Neurochemical Research* 2010;35(3):437-443.
<http://dx.doi.org/10.1007/s11064-009-0076-8>
7. Singh RP, Agarwal R. Mechanisms and preclinical efficacy of silibinin in preventing skin cancer. *Eur J Cancer* 2005;41:1969-1979.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2005.03.033>
8. Deep G, Singh RP, Agarwal C, Kroll DJ, Agarwal R. Silymarin and silybinin cause G1 and G2-M cell cycle arrest via distinct circuitries in human prostate cancer PC3 cells: a comparison of flavanone silybinin with flavanolignan mixture silymarin. *Oncogene* 2006;25:1053-1069.
<http://dx.doi.org/10.1038/sj.onc.1209146>
9. Deep G, Agarwal R. Chemopreventive efficacy of silymarin in skin and prostate cancer. *Integr Cancer Ther* 2007;6(2):130-45.
<http://dx.doi.org/10.1177/1534735407301441>
10. Werneke U, Earl J, Seydel C, Horn O, Crichton P, Fannon D. Potential health risk of complementary alternative medicines in cancer patients. *Br J Cancer* 2004;90:408-413.
<http://dx.doi.org/10.1038/sj.bjc.6601560>
11. Sparreboom A, Cox MC, Acharya MR, Figg WD. Herbal remedies in the United States: potential adverse interactions with anticancer agents. *J Clin Oncol* 2004;22:2489-2503.
<http://dx.doi.org/10.1200/JCO.2004.08.182>
12. Molassiotis A, Fernandez-Ortega P, Pud D, Ozden G, Scott JA, Panteli V, et al. Use of complementary and alternative medicine in cancer patients: a European survey. *Ann Oncol* 2005;16:655-663.
<http://dx.doi.org/10.1093/annonc/mdi110>
13. Tyagi AK, Agarwal C, Chan DC, Agarwal R. Synergistic anticancer effects of silibinin with conventional cytotoxic agents doxorubicin, cisplatin and carboplatin against human breast carcinoma MCF-7 and MDA-MB468 cells. *Oncol Rep* 2004;11(2):493-499.
14. von Schonfeld J, Weisbrod B, Muller MK. Silibinin, a plant extract with antioxidant and membrane stabilizing properties, protects exocrine pancreas from cyclosporin A toxicity. *Cell Mol Life Sci* 1997;53(11-12):917-920.
<http://dx.doi.org/10.1007/s000180050111>
15. Sridar C, Goosen TC, Kent UM, Williams JA, Hollenberg PF. Silybin inactivates cytochromes P450 3A4 and 2C9 and inhibits major hepatic glucuronosyltransferases. *Drug Metab Dispos* 2004;32(6):587-594.
<http://dx.doi.org/10.1124/dmd.32.6.587>
16. Milk thistle (*Silybum marianum*). In: Coates P, Blackman M, Cragg G, et al, eds. *Encyclopedia of Dietary Supplements*. New York: Marcel Dekker 2005:467-482.
17. Singh RP, Agarwal R. Prostate cancer chemoprevention by silibinin: bench to bedside. *Mol Carcinog* 2006;45:436-442.
<http://dx.doi.org/10.1002/mc.20223>
18. Manna SK, Mukhopadhyay A, Van NT, Aggarwal BB. Silymarin suppresses TNF induced activation of NF- κ B, c-Jun N-terminal kinase, and apoptosis. *J Immunol* 1999;161:6800-6809.
19. Yoo HG, Jung SN, Hwang YS. Involvement of NF- κ B and caspases in silibinin-induced apoptosis of endothelial cells. *Int J Molec Med* 2004;13:81-86.
<http://dx.doi.org/10.3892/ijmm.13.1.81>
20. Karimi G, Fallah Huseini H, Ramezani M, Tahoonian Z. Protective effect of silybum marianum (l.) gaertn. seeds extract and silymarin against cisplatin-induced acute nephrotoxicity in rats. *J Med Plants* 2005;4:42-45.
21. WenWu J, Lin L, Tsai T. Drug-drug interactions of silymarin on the perspective of pharmacokinetics. *J Ethnopharmacol* 2009;121:185-193.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jep.2008.10.036>
22. Metodiewa D, Koska C. Reactive oxygen species and reactive nitrogen species: relevance to cyto(neuro)toxicity events and neurological disorders. *Neurotox Res* 2000;1:197-233.
<http://dx.doi.org/10.1007/BF03033290>
23. Kren V, Walterova D. Silybin and Silymarin-New effects and applications. *Biomed Papers* 2005;149:29-41.
<http://dx.doi.org/10.5507/bp.2005.002>
24. Chu SC, Chiou HL, Chen PN, Yang SF, Hsieh YS. Silybinin inhibits the invasion of human lung cancer cells via decreased productions of urokinase-plasminogen activator and matrix metalloproteinase-2. *Mol Carcinog* 2004;40:143-149.
<http://dx.doi.org/10.1002/mc.20018>
25. Sakai K, Li Y, Shirakawa T, Kitagawa Y, Hirose G. Induction of major histocompatibility complex class I molecules on human neuroblastoma line cells by a flavoid antioxidant. *Neurosci Lett* 2001;298(2):127-30.
[http://dx.doi.org/10.1016/S0304-3940\(00\)01748-1](http://dx.doi.org/10.1016/S0304-3940(00)01748-1)
26. Chtourou Y, Trabelsi K, Fetoui H, Mkannez G, Kallel H, Zeghal N. Manganese induces oxidative stress, redox state unbalance and disrupts membrane bound ATPases on murine neuroblastoma cells *in vitro*: protective role of silymarin. *Neurochem Res* 2011;36(8):1546-57.
<http://dx.doi.org/10.1007/s11064-011-0483-5>
27. Yousefi M, Ghaffari SH, Soltani BM, Nafissi S, Momeny M, Zekri A, et al. Therapeutic efficacy of silibinin on human neuroblastoma cells: Akt and NF- κ B expressions may play an important role in silibinin-induced response. *Neurochem Res* 2012;37(9):2053-63.
<http://dx.doi.org/10.1007/s11064-012-0827-9>
28. Tyagi AK, Agarwal C, Chan DC, Agarwal R. Synergistic anti-cancer effects of silibinin with conventional cytotoxic agents doxorubicin, cisplatin and carboplatin against human breast carcinoma MCF-7 and MDA-MB468 cells. *Oncol Rep* 2004;11(2):493-9.
<http://dx.doi.org/10.3892/or.11.2.493>
29. Neuman MG, Cameron RG, Haber JA, Katz GG, Malkiewicz IM, Shear NH. Inducers of cytochrome P450 2E1 enhance methotrexate-induced hepatocytotoxicity. *Clin Biochem* 1999;32:519-536.
[http://dx.doi.org/10.1016/S0009-9120\(99\)00052-1](http://dx.doi.org/10.1016/S0009-9120(99)00052-1)
30. Mansour HH, Hafez HF, Fahmy NM. Silymarin modulates cisplatin-induced oxidative stress and hepatotoxicity in rats. *J Biochem Mol Biol* 2006;39:656-661.
<http://dx.doi.org/10.5483/BMBRep.2006.39.6.656>
31. Schumann J, Prockl J, Kiemer AK, Vollmar AM, Bang R, Tiegs G. Silibinin protects mice from T cell-dependent liver injury. *J Hepatol* 2003;39:333-340.
[http://dx.doi.org/10.1016/S0168-8278\(03\)00239-3](http://dx.doi.org/10.1016/S0168-8278(03)00239-3)
32. Nazemian F, Karimi GH, Moatamedi M, Charkazi S, Shamsara J, Moohammadpour AH. Effect of Silymarin administration on TNF- α serum concentration in peritoneal dialysis patients. *Phytother Res* 2010;24:1654-1657.
<http://dx.doi.org/10.1002/ptr.3175>
33. Bokemeyer C, Fels LM, Dunn T, Voigt W, Gaedeke J, Schmoll HJ, et al. Silibinin protects against cisplatin-induced nephrotoxicity without compromising cisplatin or ifosfamide anti-tumour activity. *Br J Cancer* 1996;74(12):2036-41.
<http://dx.doi.org/10.1038/bjc.1996.673>
34. Ladas EJ, Cheng B, Hughes D, et al. Milk thistle (*Silybum marianum*) is associated with reductions in liver function tests (LFTs). Abstract presented at: Society for Integrative Oncology 3rd International Conference; November 9-11, 2006; Boston, Mass.
35. Dhanalakshmi S, Agarwal P, Glode LM, Agarwal R. Silibinin sensitizes human prostate carcinoma DU145 cells to cisplatin- and carboplatin -induced growth inhibition and apoptotic death. *Int J Cancer* 2003;106(5):699-705.
<http://dx.doi.org/10.1002/ijc.11299>
36. Cho SI, Lee JE, Do NY. Protective effect of silymarin against cisplatin-induced ototoxicity. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2014;78(3):474-8.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.ijporl.2013.12.024>